

Domande	100%	
1	Quale dei seguenti farmaci è una terapia utilizzata per l'endometriosi?	✓
1.1	Cloramfenicolo	☐
1.2	Diazepam	☐
1.3	Dienogest	☒
1.4	Tibolone	☐
2	Qual è l'obiettivo della terapia medica nella paziente con cisti endometriosica?	✓
2.1	Il sollievo della sintomatologia dolorosa	☐
2.2	La riduzione delle recidive dopo intervento chirurgico	☐
2.3	Il controllo della progressione della malattia	☐
2.4	Tutte le risposte	☒
3	L'effetto della terapia medica:	✓
3.1	si protrae per almeno un anno dopo la sua sospensione	☐
3.2	è esclusivamente di tipo citoriduttivo	☐
3.3	consente di ottenere una gravidanza durante la sua assunzione	☐
3.4	si protrae soltanto per la durata del suo utilizzo ed i sintomi spesso ricompaiono alla sospensione	☒
4	I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS):	✓
4.1	non possiedono alcun effetto nel controllo del dolore	☐
4.2	non possono essere associati alla terapia ormonale	☐
4.3	non hanno effetto nel frenare la progressione della malattia	☒
4.4	non sono farmaci comunemente utilizzati come prima battuta in caso di dismenorrea	☐
5	Le terapie mediche:	✓
5.1	devono essere assunte a lungo termine	☒
5.2	vengono stabilite da protocolli ben definiti e non devono tenere conto delle esigenze di vita della	☐
5.3	possono essere assunte per un periodo di tempo limitato	☐
5.4	sono esclusivamente di natura ormonale	☐
6	Quale dei seguenti effetti collaterali del dienogest (progestinico) è la principale causa di interru	✓
6.1	Trombosi	☐
6.2	Ritenzione idrica	☐
6.3	Sanguinamenti vaginali ricorrenti	☒
6.4	Cefalea	☐

Domande	100%	
7	Quale delle seguenti affermazioni relative agli estro-progestinici è errata?	✓
7.1	Agiscono inibendo l'ovulazione, riducendo i livelli di gonadotropine, diminuendo l'entità del flusso	☐
7.2	La somministrazione ormonale può avvenire, con uguale efficacia, per via orale, transvaginale o tran	☐
7.3	La somministrazione continua del farmaco (senza pausa di sospensione) si è dimostrata più efficace n	☐
7.4	Sono considerati trattamenti di seconda scelta a causa dei loro importanti effetti collaterali	☒
8	La spirale medicata al progesterone:	✓
8.1	non è efficace per la dismenorrea	☐
8.2	è vantaggiosa nel controllo della sintomatologia dolorosa nelle pazienti affette da endometriosi del	☒
8.3	non ha effetto contraccettivo	☐
8.4	non può essere utilizzata dalle donne con controindicazioni all'utilizzo dei contraccettivi per via	☐
9	Quale dei seguenti sintomi si può verificare durante l'utilizzo degli analoghi del Gn-RH?	✓
9.1	Alterazioni degli indici di funzionalità renale	☐
9.2	Secchezza vaginale e vampate di calore	☒
9.3	Riduzione del campo visivo	☐
9.4	Crampi agli arti inferiori	☐
10	Il meccanismo di azione dei farmaci inibitori dell'aromatasi si basa su:	✓
10.1	blocco della produzione di estrogeni nelle aree di lesione in seguito all'inibizione dell'enzima aro	☒
10.2	legame con il recettore pituitario delle gonadotropine inibendo la pulsilità del GnRH	☐
10.3	down-regulation dei recettori GnRH a livello ipofisario	☐
10.4	legame con il recettore del progesterone	☐
11	Quali sono le opzioni terapeutiche nel momento in cui si sospetta una cisti endometriosa?	✓
11.1	L'approccio "wait and see" (osservazione senza trattamento)	☐
11.2	La terapia medica o chirurgica	☐
11.3	Le tecniche di procreazione assistita nella donna infertile e desiderosa di gravidanza	☐
11.4	Tutte le alternative sono valide: la scelta terapeutica si pone in base alle caratteristiche clinich	☒
12	Nel caso di endometriosi ovarica, quali sono le molecole farmacologiche raccomandate dalle linee gui	✓
12.1	Analoghi del GnRH	☐
12.2	Estroprogestinici o progestinici in regime continuativo	☒
12.3	Antiossidanti	☐
12.4	Danazolo	☐
13	Relativamente alla terapia chirurgica dell'endometrioma:	✓

Domande	100%	
13.1	la laparoscopia rappresenta la via di accesso chirurgico migliore grazie al recupero più veloce, al	☒
13.2	consente di giungere alla diagnosi definitiva ma non permette la stadiazione della malattia	☐
13.3	il drenaggio laparoscopico della cisti è la tecnica di prima scelta	☐
13.4	deve sempre essere eseguita per via laparotomica in quanto permette una migliore visualizzazione del	☐
14	L'indicazione all'approccio chirurgico si pone quando la cisti endometriosica:	☒
14.1	provoca sintomi resistenti alla terapia medica	☐
14.2	aumenta di dimensioni	☐
14.3	ha diametro > 3 cm in una paziente infertile	☐
14.4	tutte le risposte	☒
15	L'obiettivo dell'intervento chirurgico nella gestione del dolore pelvico è:	☒
15.1	recuperare il più possibile i normali rapporti anatomici	☐
15.2	asportare tutte le lesioni visibili	☐
15.3	prevenire la recidiva delle condizioni che hanno comportato il dolore	☐
15.4	tutte le risposte	☒
16	In caso di endometriosi extragenitale, quale delle seguenti condizioni non rappresenta un'indicazion	☒
16.1	Fallimento della terapia medica	☐
16.2	Stenosi intestinale con rischio di fenomeni subocclusivi o occlusivi	☐
16.3	Stenosi ureterale con rischio di compromissione della funzionalità renale (idroureteronefrosi)	☐
16.4	Sindrome aderenziale	☒
17	La sede più comune di endometriosi extragenitale è:	☒
17.1	l'intestino	☒
17.2	le cicatrici cutanee	☐
17.3	la parete addominale	☐
17.4	il polmone	☐
18	L'endometriosi del tratto urinario:	☒
18.1	si manifesta con disuria ed ematuria in caso di interessamento vescicale	☐
18.2	comporta un alto rischio di compromissione progressiva della funzione renale in caso di interessamen	☐
18.3	deve essere trattata chirurgicamente ogni volta che viene diagnosticata una lesione a carico dell'ur	☐
18.4	tutte le risposte	☒
19	L'infertilità:	☒
19.1	si riscontra nel 30-40% delle pazienti affette da endometriosi	☒

Domande	100%	
19.2	deve essere sempre trattata con terapia chirurgica se si vogliono aumentare le possibilità di gravid	☐
19.3	non è collegata all'età materna	☐
19.4	è più frequente nelle pazienti con endometriosi rispetto alle donne che presentano esclusivo interes	☐
20	In merito alla riserva ovarica (AMH):	✓
20.1	si osserva frequentemente una sua riduzione in seguito all'intervento chirurgico per asportazione di	☒
20.2	si riduce più significativamente dopo l'escissione di endometriosi piccoli e monolaterali	☐
20.3	non subisce variazioni nel post operatorio	☐
20.4	non è un parametro importante nella valutazione della fertilità della paziente	☐
21	Quali sono gli effetti collaterali osservati durante un trattamento prolungato con danazolo?	✓
21.1	Alterazioni del quadro lipidico	☐
21.2	Ritenzione idrica	☐
21.3	Irsutismo	☐
21.4	Tutte le risposte	☒
22	Nelle adolescenti:	✓
22.1	non si deve instaurare nessuna terapia medica	☐
22.2	si raccomanda come prima linea di trattamento l'utilizzo dei contraccettivi orali combinati, sia con	☒
22.3	i farmaci di prima scelta sono gli analoghi del GnRh	☐
22.4	si deve sempre intervenire chirurgicamente, al fine di preservare la fertilità futura	