AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3

ASL ROMA 3

REGIONE LAZIO

Dipartimento di Salute Mentale
DIREZIONE

Prot. n. 24581 **del** 17/4/2020

Al Direttore UOC SPDC S. Camillo – Grassi
Dr. Piero Petrini
Alle CPSI senior
A Tutti i dirigenti
A Tutto il Personale

E p.c. Al Commissario Straordinario
Dr. G. Quintavalle
Al Direttore Sanitario
Dr.ssa S. Amato

OGGETTO: indicazioni sui percorsi di ricovero per i pazienti psichiatrici.

Si invia quanto in oggetto (allegato 1 Descrizione /allegato 2 Flowchart/ allegato 3 scheda da compilare in PS).

Distinti saluti.

P.O. Coordinamento Attività assistenziali
DSM – SERD
Massimo Di Cesantonio

Il Direttore DSM
Dott. Andrea Balbi

Dipartimento di Salute Mentale
Via R. Giovagnoli, 29
00152 Roma

www.aslroma3.it
C.F. - P. IVA 04733491007

Tel. 06.5648.6152/3/4/5
Fax 06.5648.6115
e-mail: dsmamministrazione@aslroma3.it


PRONTO SOCCORSO
Consulenza psichiatrica per eventuale ricovero
Il PS stabilisce il grado di rischiosità del pz.
Si procede a ricovero
Soggetto dichiarato non sospetto
Soggetto dichiarato sospetto Covid
ingresso ordinario in SPDC
Primo tampone
Ingresso in SPDC in semi-isolamento in attesa del risultato del tampone
Attrezzare stanza di isolamento e zona cuscinetto per vestizione del personale
Sorveglianza temporanea del paziente con livelli di protezione DPI come da scenario Covid+
Confermato COVID+
Tampone negativo
Trasferimento in area COVID
Ammissione ordinaria in reparto
Sanificazione e pulizia degli ambienti di semi-isolamento a seconda del livello infettivo dimostrato

Indicazioni e percorsi per ricovero di pazienti psichiatrici in tempo di epidemia Covid-19

1) Valutazione psichiatrica in P.S. : necessità di ricovero

2) Il P.S. in base all'anamnesi ed alla valutazione dello stato clinico del paziente , anche tramite opportuni strumenti di screening (compilazione scheda apposita), distingue casi non sospetti e casi sospetti.

3) casi non sospetti : entrano regolarmente in reparto

4) Casi sospetti : effettuano tampone. 1) Se possibile attendono risultato in area separata del P.S con consulenza psichiatrica (o reparto pre-covid come è stato fatto in qualche Ospedale del Lazio). 2) Se non è possibile accedono ad area dell'SPDC attrezzata al semi-isolamento :
   a) **SPDC Grassi** : attrezzare stanza ex-DH per isolare paziente dagli altri
      Attrezzare una delle due stanzette antistanti il DH ad area vestizione/vestizione
   b) **SPDC S. Camillo**: attrezzare la prima stanza all'ingresso ad isolamento
      Attrezzare stanza vestizione/vestizione, anche spostando la stanza del medico di guardia nell'area ex-DH

Il personale accede alle aree di isolamento interne, in attesa di tampone, con le protezioni previste per i casi positivi. Il paziente viene invitato ad indossare mascherina se collaborante

5) Tampone negativo : normalmente in reparto

6) Tampone positivo : spostamento in reparto Covid +, con consulenza psichiatrica intensiva (in quanto l'isolamento ottenibile all'interno degli SPDC e le terapie che potrebbero essere necessarie non sono adeguate) . La stanza viene sanificata.
   Ciò si ritiene fattibile anche perché le ben note difficoltà respiratorie connesse all'infezione Covid, rendono le persone affette 'meno attive' su un piano comportamentale

REGIONE LAZIO

INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI PSICHIATRICI ALL'INTERNO DEL PERCORSO OSPEDALIERO

4.2 PAZIENTI NON COLLABORANTI

1. I pazienti psichiatrici non collaboranti COVID positivi, che siano asintomatici o paucisintomatici, vanno isolati dagli altri pazienti, possibilmente in una stanza singola, non devono frequentare gli spazi comuni, e devono essere ricoverati in un SPDC COVID collocato in un ospedale COVID, possibilmente con caratteristiche di HUB, con percorsi specifici già definiti, nei quali è possibile effettuare isolamento di coorte. Tale tipologia di utenti corrisponde a quelli per cui sarebbe indicato un isolamento fiduciario a domicilio per condizioni COVID, che è però impossibile da attuare a causa della patologia psichiatrica. In assenza di disponibilità di posti letto in SPDC COVID il paziente psichiatrico rimane temporaneamente ricoverato nella struttura COVID dedicata.
2. Gli operatori dovranno indossare i DPI previsti dalla Tabella 2 delle citate Raccomandazioni per le procedure o setting a rischio di generazione di aerosol.